

結膜側結紮皮膚挙筋固定法1糸6点固定による 埋没法二重術の600症例を経験して

600 cases of buried-suture double-eyelid blepharoplasty using subconjunctival buried knots, skin-levator ligate method and 6-stitch buried suture method.

坂西 寛信/岩山 隆憲/居川 和広/奥田 宗央/中村 大輔/相川 佳之

Sakanishi Hironobu,M.D.,Iwayama Takanori,M.D., Igawa Kazuhiro,M.D., Okuda Muneo,M.D.,
Nakamura Daisuke,M.D., Aikawa Yoshiyuki,M.D.

湘南美容外科クリニック
Shonan Beauty Clinic

■抄録

本邦において、埋没法二重術は術後の回復時間の早さと可逆性から人気の高い美容整形手術になります。

埋没法二重術には糸のかけ方により、結節縫合と連続縫合があります。結節縫合においては、埋没法糸の本数により1点法、2点法、3点法など呼ばれています。また、固定方法により、皮膚瞼板固定法と皮膚挙筋固定法があります。結紮を行う位置により、皮膚側結紮法と結膜側結紮法に分類されます。いずれの方法も長所と短所があり、術者の好みにより使い分けられているのが現状です。埋没法二重術はどのような方法を行っても重瞼線はいずれ消失してしまう可能性が高い手術になり、重瞼線がより残存するように工夫を凝らした手術が多数報告されています。

今回我々は、重瞼線を出来る限り自然に長く続くようにするため、皮膚挙筋固定法で結膜側結紮法を利用し、1本の糸を皮膚側で6点固定する方法を2013年3月より開始し2014年12月までに600例ほど経験いたしましたので、若干の考察を含め症例の報告させていただきます。

■Abstract

Although numerous surgical procedures for buried-suture double-eyelid blepharoplasty have been described in the literature. In this article, the author describes buried-suture double-eyelid blepharoplasty using subconjunctival buried knots , skin-levator ligate method and 6-stitch buried suture method. A retrospective study was conducted on 600 consecutive patients who underwent buried-suture double-eyelid blepharoplasty between March 2013 and December 2014.The author would like to report a few such clinical cases with considerations.

memo
